

# FOLPAN® 80 WDG

Fongicide granulaire hydrodispersable qui offre une protection exceptionnelle contre les maladies les plus courantes et nuisibles sur le plan économique dans les raisins et d'autres cultures fruitières, végétales et ornementales.

## MATIÈRE ACTIVE

Folpet

## GROUPE DE CHIMIE

Groupe M

## DOSES D'APPLICATION ET FORMATS

- 0,5 à 2 kg/acre
- 0,5 kg/acre, soit 20 acres par sachet
- 2 kg/acre, soit 5 acres par sachet
- Sachet de 10 kg

## CULTURES HOMOLOGUÉES :

- Azalée
- Chrysanthème
- Citrouille
- Concombres de grande culture
- Courge
- Fraises
- Iris
- Melons
- Muflier
- Œillet des fleuristes
- Poinsettia (de serre)
- Pommes
- Pommettes
- Raisins
- Tagète
- Tomates de plein champ
- Zinnia

## PRINCIPALES MALADIES SUPPRIMÉES :

- Alternariose
- Anthracnose
- Excoriose
- Mildiou
- Moucheture
- Oïdium
- Pourridié pythien
- Pourriture de la tige
- Pourriture du fruit
- Pourriture grise
- Pourriture noire
- Tache des feuilles
- Tache de suie (Didymellina)
- Tache de suie
- Tache phoméenne
- Tache septorienne
- Tavelure

## FONCTIONNEMENT :

Fongicide à action par contact multisites à capacité protectrice. Utiliser régulièrement dans le cadre d'un programme de protection établi.

## MOMENT D'APPLICATION ET STADE DE LA CULTURE :

Culture	Maladies	Moment d'application
Pomme et pommette	Alternariose, pourriture noire, tache phoméenne, moucheture, tavelure, tache de suie	Appliquer dans le cadre d'un programme de protection régulier, à partir du stade du bouton vert jusqu'à la récolte. Ne pas faire plus de 6 applications par saison. Consulter l'étiquette pour les précautions supplémentaires.
Canneberges	Pourriture du fruit	Appliquer lorsque 5 % des bourgeons floraux sont ouverts. Répéter 10 à 14 jours plus tard lorsque 50 à 75 % des bourgeons sont ouverts.
Raisins	Excoriose	Appliquer lorsque les nouvelles pousses mesurent de 1 à 2 po de longueur, et répéter lorsqu'elles mesurent de 4 à 6 po de longueur.
	Pourriture noire, mildiou	Appliquer juste avant la floraison, juste après la floraison et lors du premier traitement postfloral. Pour supprimer le mildiou, un traitement supplémentaire 2 ou 3 semaines plus tard pourrait s'avérer nécessaire.
	Oïdium	Appliquer dans un mélange en cuve avec Kumulus® DF dès l'apparition du mildiou et répéter 10 jours plus tard.

# FOLPAN® 80 WDG

## MOMENT D'APPLICATION ET STADE DE LA CULTURE (suite) :

Culture	Maladies	Moment d'application
Concombres de grande culture, melons, citrouilles, courge	Anthraxnose, mildiou	Appliquer lorsque les premières feuilles véritables apparaissent. Répéter à intervalles de 7 jours jusqu'à la récolte.
Tomates de plein champ	Anthraxnose	Appliquer durant la première floraison et répéter à des intervalles de 7 jours jusqu'à la récolte.
Fraises	Pourriture grise, pourriture du fruit, tache des feuilles	Appliquer avant l'infection initiale et répéter à intervalles de 7 jours jusqu'à la récolte.
Œillet des fleuristes, poinsettia, azalée, tagète, zinnia, chrysanthème, iris, mufler	Pourriture brune, pourridié pythien, pourriture de la tige, alternariose, tache septoriennne, tache des feuilles (Didymellina), anthracnose (selon l'espèce ornementale)	De façon générale, appliquer lors de la levée des plantes ornementales et répéter les traitements à intervalles réguliers. Consulter l'étiquette pour le moment d'application spécifique selon les maladies et les plantes ornementales.

### VOLUME D'EAU :

Par voie terrestre seulement :  
400 à 1 200 L/acre

### RÉSISTANCE À L'ENTRAÎNEMENT PAR LA PLUIE :

Aucune

### MÉLANGES EN CUVE VALIDÉS :

- Les insecticides, adjuvants et fongicides les plus courants. Vérifier la compatibilité des produits avant de les mélanger en cuve.
- L'activité fongicide est réduite quand on mélange le produit avec des substances très alcalines comme la chaux hydratée.
- Ne pas utiliser avec ou immédiatement après une pulvérisation d'huile.

### DIRECTIVES DE MÉLANGE :

1. Remplir presque complètement la cuve du pulvérisateur avec de l'eau et verser la quantité recommandée de Folpan® 80 WDG sur la surface de l'eau.
2. Le fongicide peut être mélangé à l'avance dans un seau à moitié rempli d'eau. Ce mélange peut ensuite être versé dans la cuve presque remplie du réservoir à travers un tamis.
3. Terminer le remplissage de la cuve du pulvérisateur.
4. Maintenir l'agitation pendant le remplissage et la pulvérisation.

### ROTATION DES CULTURES :

Aucune

### DÉLAIS D'ATTENTE AVANT LA RÉCOLTE :

### RESTRICTIONS CONCERNANT LE PÂTURAGE :

Aucune

- Canneberges : 30 jours
- Citrouilles : 1 jour
- Concombres de grande culture : 1 jour
- Courge : 1 jour
- Fraises : 1 jour
- Melons : 1 jour
- Raisins : 1 jour
- Tomates de plein champ : 1 jour

### ENTREPOSAGE :

Aucune

### CONSEILS PRATIQUES :

Folpan 80 WDG peut être mélangé avec la plupart des insecticides, adjuvants et fongicides les plus courants. Vérifier la compatibilité des produits avant de les mélanger en cuve.



Il est important de toujours lire et suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette des pesticides.