

DÉSINFECTANT GÉNÉRAL D'ENTREPÔT D'AG-SERVICES INC.


Désinfectant liquide nettoyant et désodorisant à employer dans les entrepôts de pommes de terre, entrepôts de légumes et autres endroits d'emmagasinement.

Utilisé conformément aux directives de l'étiquette, le Désinfectant général d'entrepôt d'Ag Services assure un contrôle efficace de la flétrissure bactérienne (*Corynebacterium sepedonicum*).

COMMERCIAL

GARANTIE: Chlorure de n-alkyl (40% C₁₂, 50% C₁₄, 10% C₁₆) diméthyl-benzyl ammonium..... 10.0%

ATTENTION



CORROSIF

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

ENREGISTREMENT NO. 14957
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET: 4L 20L 200L

FABRIQUÉ PAR:
AG-SERVICES INC.
116 Kenpark Avenue
Brampton ON L6Z 3J8

PRÉCAUTIONS:

Corrosif: peut causer de graves dommages aux yeux et à la peau. Ne pas en recevoir dans les yeux, sur la peau ou sur les vêtements, GARDER HORS D'ATTEINTE DES ENFANTS. Éviter de contaminer la nourriture.

REMARQUE: Ne pas respirer le buée de produit chimique dilué que crée l'application avec appareil de lavage sous pression. Porter des vêtements protecteurs appropriés (gants, lunettes à coques, bottes de caoutchouc, costume de plongée, respirateur antibuée) quand on utilise des appareils de lavage sous pression.

PREMIERS SOINS:

En cas de contact, rincer immédiatement les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes et faire appel au médecin. Laver généreusement la peau à l'eau. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les porter de nouveau. Produit avalé: boire au plus tôt une forte quantité de lait, de blanc d'oeuf, de solution de gélatine ou, à défaut de ces matières, boire de fortes quantités d'eau. Éviter l'alcool. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. FAIRE APPEL AU MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

DONNÉES TOXICOLOGIQUES:

La probabilité de dommages aux muqueuses contre-indique le recours au lavage d'estomac. Des mesures contre le choc circulatoire, la depression respiratoire et les convulsions peuvent être nécessaires.

ÉLIMINATION:

1. Rincer à fond le contenant une fois vide puis ajoute les rinçures à l'endroit du traitement.
2. Suivre les directives provinciales pour tout autre nettoyage du contenant qui s'impose avant son élimination ou sa remise en état.
3. Sa defaire du contenant conformément aux exigences provinciales.
4. Renseignements sur l'élimination du produit inutilisé don't on ne veut plus et sur le nettoyage des déversements: communiquer avec le bureau regional d'Environnement Canada.
5. Petits déversements: récupérer le liquide libre et imprégner les résidus d'absorbant des solides. NE PAS RINCER EN DIRECTION DE COURS D'EAU DE SURFACE. AVERTIR ENVIRONNEMENT CANADA COMME À L'ARTICLE 4.

À L'ATTENTION DE L'USAGER:

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

Le Désinfectant general d'entrepôt d'Ag-Services Inc. et à la fois désinfectant, nettoyant et désodorisant quand on l'emploie conformément au mode d'emploi, en plus d'assurer un contrôle efficace de la flétrissure (*Corynebacterium sepedonicum*). Pour obtenir les meilleurs résultats, nettoyer et laver à fond les surfaces non poreuses avant de les traiter avec une solution diluée de Désinfectant general d'entrepôt d'Ag-Services Inc., n'ajouter que de l'eau propre comme agent de dilution. Ne pas ajouter de savon ni d'autre détergent.

MODE D'EMPLOI:

Pour désinfecter les murs et planchers des locaux pour pommes de terre de semence, nettoyer à fond avec une solution de 60 mL dans 10 litres d'eau. On peut employer une solution de la même concentration pour désinfecter les sacs déjà utilisés ou les planteuses de pommes de terre et toute autre machinerie après les avoir débarrassés de la terre ou de la boue durcie.

Équipement: Tout équipement de manutention ou de plantation doit être nettoyé et traité de façon périodique (chaque jour quand on prépare les tubercules de semence et plantons). Traiter l'équipement selon les méthodes à la vadrouille et à la brosse. Employer 60 mL de désinfectant dans 10 litres d'eau de dilution ou bien 600 mL par baril de 100 litres.

Boîtes, classes et panniens: Pulvériser ou baigner les contenants à l'aide d'une solution de 60 mL de désinfectant dans 10 litres d'eau ou 600 mL par 100 litres.

Murs et plafonds des entrepôts: Diluer 600 mL de désinfectant dans 100 litres d'eau. Pulvériser les surfaces à l'aide d'une buse à forte pression (jusqu'à 4250 kPa de pression) de façon à pénétrer dans les fentes, fissures, etc. des planchers. Bâtis en A et autres conduits d'air des entrepôts: solution de 1,2 litre de Désinfectant general d'entrepôt d'Ag-Services Inc. dans 100 litres d'eau. Gaines d'air, caissons de ventilation et conduits d'air sous la surface doivent être nettoyés à fond.

Entrepôts de légumes: Suivre les mêmes règles de nettoyage et de désinfection que pour les entrepôts de pommes de terre. Utiliser le Désinfectant general d'entrepôt d'Ag-Services Inc. aux mêmes concentrations. Toutes les surfaces qui peuvent par la suite entrer en contact avec des parties comestibles de nourriture doivent être rincées à l'eau propre et potable une fois que la période de désinfection est terminée.

Aires d'entreposage en general: Toutes les aires d'entreposage à désinfecter doivent être nettoyées et lavées avant leur traitement. Diluer 60 mL de désinfectant dans 10 litres d'eau. Appliquer généreusement la solution à toutes les surfaces en assurant une période de contact d'au moins 20 minutes. Au besoin, rincer à l'eau propre.