

2016-3221
2016-09-28

GROUPE	3	INSECTICIDE
--------	---	-------------

Poleci 2,5 EC
Insecticide, Région Ouest

POUR VENTE POUR UTILISATION EXCLUSIVE DANS LES PRAIRIES ET DANS LA
RÉGION DE LA RIVIÈRE DE LA PAIX EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

COMMERCIAL

AVERTISSEMENT
{Skull and Crossbones in Diamond}
POISON

IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU

PEUT SENSIBILISER LA PEAU

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE AVANT L'EMPLOI

N° D'HOMOLOGATION 32447 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

GARANTIE : Deltaméthrine 25 g/L

CONTENU NET : 1-1050 Litres et Vrac

Sharda Cropchem Limited
Domnic Holm
29th Road, Bandra (West) Mumbai 400050 India

Sharda Cropchem Limited
601 – 402 – 21st Street East
Saskatoon SK S7K 0C3
1-888-931-2530

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif ou mortel si ingéré. Irritant pour les yeux. Peut irriter la peau. **ÉVITER** tout contact avec les yeux et la peau. Peut sensibiliser la peau. Le contact prolongé ou répété avec la peau pourrait causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

Porter une chemise à manches longues et un pantalon (ou une combinaison), des gants résistants aux produits chimiques, des lunettes de protection ou un écran facial durant le mélange, le chargement, le nettoyage et les réparations. Les travailleurs doivent porter des gants résistants aux produits chimiques et un respirateur approuvée par le NIOSH et muni d'une cartouche contre les vapeurs organiques avec un pré-filtre approuvé pour les pesticides ou une boîte filtrante approuvée par le NIOSH pour les pesticides lors du mélange, du remplissage et de l'application de deltaméthrin à l'aide d'un pulvérisateur manuel à compression mécanique.

Enlever les vêtements contaminés chaque jour et les laver, séparément des autres vêtements, avant de les remettre. Nettoyer l'équipement protecteur chaque jour. **NE PAS** manipuler le produit les mains nues. Les gants résistant aux produits chimiques réduisent considérablement l'exposition des mains.

NE PAS UTILISER DE GANTS EN CUIR OU EN TISSU. Rincer les gants à l'eau et au savon avant de les enlever et bien se laver les mains avant de manger, de fumer ou de boire.

NE PAS pénétrer ou permettre l'accès aux travailleurs dans les zones traitées durant le délai de sécurité de 12 heures

Appliquer seulement lorsque le potentiel de dérive vers les secteurs résidentiels, ou vers des secteurs servant aux activités humaines (résidences, chalets, écoles et zones récréatives) est minimal. Prendre en considération la vitesse du vent, direction du vent, les inversions de température, l'équipement d'application et les paramètres du pulvérisateur.

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

TOXIQUE POUR LES POISSONS ET LES ORGANISMES AQUATIQUES. Ne pas appliquer là où les cours d'eau, lacs, étangs ou l'eau utilisée par le bétail ou à des fins domestiques risquent d'être contaminés. Ce produit contient des distillats du pétrole qui sont modérément à très toxiques pour les organismes aquatiques. Éviter toute contamination des systèmes aquatiques durant l'application. Ne pas contaminer ces systèmes par l'application directe de ce produit, le nettoyage de l'équipement ou l'élimination des déchets. **TOXIQUE POUR LES ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES UTILES.** Éviter de pulvériser lorsque les abeilles butinent.

IL FAUT TOUJOURS LAISSER DES BORDURES NON TRAITÉES AUTOUR DES ZONES ÉCOLOGIQUEMENT FRAGILES (p. ex., marécages, bourbiers, maisons, bâtiments de ferme). La profondeur de la bordure dépend de la méthode d'application. **AVANT D'APPLIQUER** Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest, lire attentivement et complètement les sections de la présente étiquette relatives à la méthode d'application visée.

ÉVITER D'APPLIQUER LORSQUE DES INVERSIONS DE TEMPÉRATURES

PRÉVALENT, OU DURANT LES PÉRIODES DE GRANDE CHALEUR (par exemple, températures diurnes dépassant 25°C) car le degré de suppression sera réduit. On obtiendra les meilleurs résultats en appliquant Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest durant les périodes plus fraîches de la journée (par exemple tôt le matin ou au crépuscule).

PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Ce produit renferme des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie de déglutition. Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE

NE PEUT ÊTRE ENTREPOSÉ EN DEÇÀ DU POINT DE CONGÉLATION. Si le produit est entreposé pendant au moins un an, bien secouer avant d'utiliser. Entreposer le contenant hermétiquement fermé à l'écart de la nourriture de consommation animale, des semences, des engrais, des plantes et des denrées. Entreposer dans le contenant d'origine.

ÉLIMINATION DU CONTENANT RECYCLABLE :

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant:

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

ÉLIMINATION DU PRODUIT NON UTILISÉ OU DONT ON VEUT SE DÉPARTIR:

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial.

S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

ÉLIMINATION DE LA SOLUTION DE PULVÉRISATION NON UTILISÉE :

S'il reste de la solution de pulvérisation dans le réservoir après le traitement, elle doit être pulvérisée sur le périmètre du champ qui vient d'être traité, non pas sur la culture, à l'écart des sources d'approvisionnement en eau, fossés et canaux d'irrigation.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Poleci 2,5 EC
Insecticide, Région Ouest

POUR VENTE POUR UTILISATION EXCLUSIVE DANS LES PRAIRIES ET DANS LA
RÉGION DE LA RIVIÈRE DE LA PAIX EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

COMMERCIAL

AVERTISSEMENT
{Skull and Crossbones in Diamond}
POISON

IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU

PEUT SENSIBILISER LA PEAU

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE AVANT L'EMPLOI

N° D'HOMOLOGATION 32447 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

GARANTIE : Deltaméthrine 25 g/L

CONTENU NET : 1-1050 Litres et Vrac

Sharda Cropchem Limited
Domnic Holm
29th Road, Bandra (West) Mumbai 400050 India

Sharda Cropchem Limited
601 – 402 – 21st Street East
Saskatoon SK S7K 0C3
1-888-931-2530

POUR VENTE POUR UTILISATION EXCLUSIVE DANS LES PRAIRIES ET DANS LA RÉGION DE LA RIVIÈRE DE LA PAIX EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest n'est pas un produit systémique. Il supprime les insectes au contact et/ou par ingestion. Pour une efficacité maximale, il est nécessaire :

- de maintenir la culture et les insectes sous observation afin de pouvoir pulvériser au moment approprié;
- de s'assurer que les insectes sont touchés lors de la pulvérisation, particulièrement s'ils se trouvent sur le dessous des feuilles ou si le feuillage est très dense.

Les volumes d'eau peuvent varier considérablement selon l'équipement, la culture et les conditions culturales. Les volumes d'eau réels à utiliser varieront de 11 à 1 000 litres par hectare.

La distribution du produit sur les surfaces des plantes doit être aussi uniforme que possible là où les insectes se déplacent et/ou se nourrissent

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif ou mortel si ingéré. Irritant pour les yeux. Peut irriter la peau. **ÉVITER** tout contact avec les yeux et la peau. Peut sensibiliser la peau. Le contact prolongé ou répété avec la peau pourrait causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

Porter une chemise à manches longues et un pantalon (ou une combinaison), des gants résistants aux produits chimiques, des lunettes de protection ou un écran facial durant le mélange, le chargement, le nettoyage et les réparations. Les travailleurs doivent porter des gants résistants aux produits chimiques et un respirateur approuvée par le NIOSH et muni d'une cartouche contre les vapeurs organiques avec un pré-filtre approuvé pour les pesticides ou une boîte filtrante approuvée par le NIOSH pour les pesticides lors du mélange, du remplissage et de l'application de deltaméthrin à l'aide d'un pulvérisateur manuel à compression mécanique.

Enlever les vêtements contaminés chaque jour et les laver, séparément des autres vêtements, avant de les remettre. Nettoyer l'équipement protecteur chaque jour. **NE PAS** manipuler le produit les mains nues. Les gants résistant aux produits chimiques réduisent considérablement l'exposition des mains.

NE PAS UTILISER DE GANTS EN CUIR OU EN TISSU. Rincer les gants à l'eau et au savon avant de les enlever et bien se laver les mains avant de manger, de fumer ou de boire.

NE PAS pénétrer ou permettre l'accès aux travailleurs dans les zones traitées durant le délai de sécurité de 12 heures

Appliquer seulement lorsque le potentiel de dérive vers les secteurs résidentiels, ou vers des secteurs servant aux activités humaines (résidences, chalets, écoles et zones récréatives) est minimal. Prendre en considération la vitesse du vent, direction du vent, les inversions de température, l'équipement d'application et les paramètres du pulvérisateur.

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

TOXIQUE POUR LES POISSONS ET LES ORGANISMES AQUATIQUES. Ne pas appliquer là où

les cours d'eau, lacs, étangs ou l'eau utilisée par le bétail ou à des fins domestiques risquent d'être contaminés. Ce produit contient des distillats du pétrole qui sont modérément à très toxiques pour les organismes aquatiques. Éviter toute contamination des systèmes aquatiques durant l'application. Ne pas contaminer ces systèmes par l'application directe de ce produit, le nettoyage de l'équipement ou l'élimination des déchets.

TOXIQUE POUR LES ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES UTILES. Éviter de pulvériser lorsque les abeilles butinent.

IL FAUT TOUJOURS LAISSER DES BORDURES NON TRAITÉES AUTOUR DES ZONES ÉCOLOGIQUEMENT FRAGILES (p. ex., marécages, bourniers, maisons, bâtiments de ferme). La profondeur de la bordure dépend de la méthode d'application.

AVANT D'APPLIQUER Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest, lire attentivement et complètement les sections de la présente étiquette relatives à la méthode d'application visée.

ÉVITER D'APPLIQUER LORSQUE DES INVERSIONS DE TEMPÉRATURES PRÉVALENT, OU DURANT LES PÉRIODES DE GRANDE CHALEUR (par exemple, températures diurnes dépassant 25°C) car le degré de suppression sera réduit. On obtiendra les meilleurs résultats en appliquant Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest durant les périodes plus fraîches de la journée (par exemple tôt le matin ou au crépuscule).

PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS**

D'INHALATION, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Ce produit renferme des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie de déglutition. Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE

NE PEUT ÊTRE ENTREPOSÉ EN DEÇÀ DU POINT DE CONGÉLATION. Si le produit est entreposé pendant au moins un an, bien secouer avant d'utiliser. Entreposer le contenant hermétiquement fermé à l'écart de la nourriture de consommation animale, des semences, des engrais, des plantes et des denrées. Entreposer dans le contenant d'origine.

ÉLIMINATION DU CONTENANT RECYCLABLE :

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant:

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

ÉLIMINATION DU PRODUIT NON UTILISÉ OU DONT ON VEUT SE DÉPARTIR:

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

ÉLIMINATION DE LA SOLUTION DE PULVÉRISATION NON UTILISÉE :

S'il reste de la solution de pulvérisation dans le réservoir après le traitement, elle doit être pulvérisée sur le périmètre du champ qui vient d'être traité, non pas sur la culture, à l'écart des sources d'approvisionnement en eau, fossés et canaux d'irrigation.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

MODE D'EMPLOI

Lorsqu'une échelle de doses est indiquée dans le « Mode d'emploi », la dose la plus élevée doit être utilisée :

1. lorsque le couvert de la culture est dense et empêche la pénétration de la solution de pulvérisation;
2. lorsque plusieurs stades de croissance des insectes sont visibles (par exemple stades nymphaux 1 à 5 de la sauterelle OU larves et adultes du doryphore de la pomme de terre);
3. lorsque les populations d'insectes sont très élevées.

À moins d'indications contraires, appliquer Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest dès l'apparition des insectes et répéter au besoin pour maintenir la suppression. Utiliser suffisamment d'eau pour assurer un épandage intégral. Une plus grande quantité d'eau peut être nécessaire lorsque le feuillage est dense et selon le type d'équipement de pulvérisation utilisé. Il est essentiel de bien mouiller toutes les plantes pour obtenir de bons résultats. Il est recommandé de suivre les calendriers de traitements provinciaux.

Lorsqu'on utilise de l'équipement de pulvérisation terrestre, s'assurer qu'une bordure de 15 mètres est maintenue autour des zones écologiquement fragiles (p. ex., marécages, bourniers, maisons, bâtiments de ferme). Consulter la section ÉPANDAGE AÉRIEN de cette étiquette pour connaître les précautions appropriées lors de l'application par voie aérienne.

Utiliser les doses indiquées ci-après pour l'application terrestre et aérienne. Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest peut être appliqué par voie aérienne uniquement sur les cultures qui prévoient l'application aérienne. Consulter la section ÉPANDAGE AÉRIEN de cette étiquette pour ajuster les volumes d'eau.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES RELATIVEMENT À L'APPLICATION DE POLECI 2,5 EC INSECTICIDE, RÉGION OUEST SUR DES SOLS TRÈS ORGANIQUES (TERRES NOIRES) :

Dans les sols à haute teneur en matière organique (terres noires), des soins particuliers s'imposent pour l'application de Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest. Ne pas appliquer plus de 200 mL de Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest par hectare. Sur les terres noires, Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest ne doit être appliqué qu'UNE SEULE FOIS à chaque année de culture, avant le 1^{er} août.

ÉPANDAGE AÉRIEN :

Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest peut être appliqué par voie aérienne sur le blé, l'orge, l'avoine, le lin, le colza, le canola, la moutarde, le tournesol, les plantations brise-vent (livrée des forêts seulement), les pommes de terre, les lentilles, les parcours et les pâturages.

Épandre seulement avec un avion ou un hélicoptère réglé et étalonné pour être utilisé dans les conditions atmosphériques de la région et selon les taux et directives figurant sur l'étiquette. Les précautions à prendre ainsi que les directives et taux d'épandage à respecter sont propres au produit. Lire attentivement l'étiquette et s'assurer de bien la comprendre avant d'ouvrir le contenant. Utiliser seulement les quantités recommandées pour l'épandage aérien qui sont indiquées sur l'étiquette. Si, pour l'utilisation prévue du produit, aucun taux d'épandage aérien ne figure sur l'étiquette, on ne peut utiliser ce produit, et ce, quel que soit le type d'appareil aérien disponible. S'assurer que l'épandage est uniforme. Afin d'éviter que le produit ne soit épandu de façon non uniforme (épandage en bandes, irrégulier ou double), utiliser des marqueurs appropriés.

MISES EN GARDE CONCERNANT L'UTILISATION :

Épandre seulement quand les conditions météorologiques à l'endroit traité permettent une couverture complète et uniforme de la culture visée. Les conditions favorables spécifiques à l'épandage aérien décrites dans les *Exigences relatives aux connaissances fondamentales requises pour la formation sur les pesticides au Canada Tronc Commun – Utilisation des pesticides et Module – Pulvérisation aérienne* (élaborées par l'ACRCP) doivent être présentes. Ne pas épandre de pesticides sur les étendues d'eau. Éviter que la dérive n'atteigne une étendue d'eau ou tout autre endroit non visé. Les zones tampons indiquées devraient être respectées. Les grosses gouttelettes sont moins sujettes à la dérive; il faut donc éviter les pressions et les types de buses qui permettent la formation de fines particules (brume). Ne pas épandre par temps mort ou lorsque la vitesse du vent et son orientation peuvent provoquer une dérive. Ne pas épandre

également lorsque le vent souffle en direction d'une culture, d'un jardin, d'un habitat terrestre (plantations brise-vent, etc.) ou aquatique vulnérable.

MISES EN GARDE CONCERNANT L'OPÉRATEUR ANTIPARASITAIRE :

Ne pas permettre au pilote de mélanger les produits chimiques qui seront embarqués à bord de l'appareil. Il peut toutefois charger des produits chimiques pré-mélangés contenus dans un système fermé. Il serait préférable que le pilote puisse établir une communication à chaque emplacement traité au moment de l'épandage. Le personnel au sol de même que les personnes qui s'occupent des mélanges et du chargement doivent porter des gants, des combinaison et des lunettes ou un masque les protégeant contre les produits chimiques durant le mélange des produits, le chargement, le nettoyage et les réparations. Lorsque les précautions qu'on recommande à l'opérateur de prendre sont plus strictes que les recommandations générales qui figurent sur les étiquettes pour épandage avec pulvérisateur terrestre, suivre les précautions les plus rigoureuses. Tout le personnel doit se laver les mains et le visage à grande eau avant de manger et de boire. Les vêtements protecteurs, le cockpit de l'avion et les cabines des véhicules doivent être décontaminés régulièrement.

PRÉCAUTIONS RELATIVES AU PRODUIT :

Lorsqu'on applique Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest par voie aérienne, un épandage uniforme est essentiel. Pour obtenir un épandage uniforme, il est recommandé d'utiliser des buses de pulvérisation et des pressions permettant de produire de petites gouttelettes (de 150 à 250 microns).

Appliquer Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest dans 11 à 22 litres d'eau par hectare à une pression d'au moins 200 kPa. Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser suffisamment d'eau pour obtenir un épandage complet et intégral. **NE PAS UTILISER DE BUSES RAINDROP.** Suivre les autres directives sur l'étiquette pour connaître la bonne dose, la période d'application et les restrictions relatives à la récolte.

Note : S'assurer que tous les circuits (tuyaux, rampes, etc.) ont la bonne concentration de Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest et d'eau avant de commencer l'application.

NE PAS appliquer Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest par voie aérienne lorsque le vent souffle à plus de 8 km/h.

Prévoir un tampon de 100 mètres entre le bord du champ traité et les zones écologiquement fragiles (par exemple, marécages, bourbiers, maisons, bâtiments de ferme). S'il est impossible de maintenir une zone tampon de 100 mètres, il faut alors effectuer une application terrestre seulement. Dans ce cas-ci, il faut prévoir une zone tampon de 15 mètres. Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest est très toxique pour les organismes aquatiques et les poissons et la sur application ou la dérive doivent être évitées dans les zones écologiquement fragiles.

ÉVITER D'APPLIQUER LORSQUE DES INVERSIONS DE TEMPÉRATURES PRÉVALENT, OU DURANT LES PÉRIODES DE GRANDE CHALEUR (par exemple, températures diurnes dépassant 25°C) car le degré de suppression sera réduit. On obtiendra les meilleurs résultats en appliquant Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest durant les périodes plus fraîches de la journée (par exemple tôt le matin ou au crépuscule).

MÉLANGES EN CUVE

Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest peut être mélangé en cuve avec un certain nombre d'herbicides pour la suppression des insectes nuisibles (mentionnés sur cette étiquette) et des

graminées et mauvaises herbes à feuilles larges annuelles (voir la liste des mauvaises herbes sensibles sur les étiquettes des herbicides). Lire attentivement chaque étiquette pour connaître l'emploi approprié. Les herbicides suivants sont compatibles :

	PARDNER®	BANVEL®	2,4-D
	BUCTRIL® M		MCPA
PUMA ¹²⁰ SUPER®	PUMA ¹²⁰ SUPER® avec BUCTRIL® M		

Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest peut être mélangé en cuve avec Puma¹²⁰ Super pour la suppression des sauterelles et graminées annuelles ou avec Puma¹²⁰ Super et Bucril M pour la suppression des sauterelles et des graminées et mauvaises herbes à feuilles larges annuelles dans LE BLÉ DE PRINTEMPS ET LE BLÉ DUR SEULEMENT. Le cultivar de blé dur « Plenty » peut supporter un degré élevé de dommages suite à une application de Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest avec Puma¹²⁰ Super et Bucril M.

La solution de pulvérisation doit être constamment agitée tout au long de l'épandage. Ne pas laisser la solution de pulvérisation dans le réservoir plus de quatre heures après le mélange.

Lorsqu'on utilise un mélange en cuve, il faut consulter les étiquettes des produits d'association et respecter la zone tampon la plus grande (la plus restrictive) des produits utilisés dans ce mélange en cuve.

RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE :

Aux fins de la gestion de la résistance, Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest contient un insecticide du Groupe 3. Toute population d'insectes peut renfermer des individus naturellement résistants à Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest et à d'autres insecticides du Groupe 3. Ces individus résistants peuvent finir par prédominer au sein de leur population si ces insecticides sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il peut exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder la résistance aux insecticides :

- Dans la mesure du possible, alterner Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest ou les insecticides du même groupe avec des insecticides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes organismes nuisibles.
- Utiliser des mélanges en cuve contenant des insecticides provenant d'un groupe différent, si cet emploi est permis.
- Utiliser les insecticides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée comprenant des inspections sur le terrain, la tenue de dossiers, et qui envisage la possibilité d'intégrer des pratiques de lutte culturale, biologique, ou d'autres formes de lutte chimique.
- Inspecter les populations d'insectes traitées pour y découvrir les signes de l'acquisition d'une résistance.
- Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s'adresser au spécialiste local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la Lutte intégrée.
- Pour plus d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s'adresser à Sharda Cropchem Limited 1-888-931-2530.

CULTURES	INSECTES	MÉTHODE D'APPLICATION ET RECOMMANDATIONS	DOSE
Luzerne (production de semence seulement)	Charançon postiche de la luzerne, punaises	TERRESTRE Appliquer en présence des insectes ou si les spécialistes provinciaux recommandent l'épandage. Utiliser la dose la plus élevée si le charançon postiche de la luzerne est présent.	400 à 500 mL/ha dans 100 à 300 L d'eau par hectare
NE PAS FAIRE PLUS DE 1 APPLICATION PAR ANNÉE. NE PAS APPLIQUER DANS LES 20 JOURS PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE.			
Brocoli, chou de Bruxelles, chou, chou-fleur	Piéride du chou, fausse-arpenteuse du chou, fausse-teigne des crucifères	TERRESTRE Appliquer en présence des insectes ou de signes de dommages évidents. Répéter le traitement aux 10 jours, au besoin.	300 à 400 mL/ha dans 350 à 550 L d'eau par hectare
NE PAS APPLIQUER DANS LES 24 HEURES PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE DES CHOUX DE BRUXELLES. NE PAS APPLIQUER DANS LES 3 JOURS PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE DU BROCOLI, DU CHOU OU DU CHOU-FLEUR. PEUT ÊTRE APPLIQUÉ UNE FOIS PAR SAISON SUR LES SOLS TRÈS ORGANIQUES (TERRES NOIRES). POUR RÉDUIRE LES RÉSIDUS, APPLIQUER AVANT LE 1 ^{er} AOÛT.			
Maïs cultivé	Pyrale du maïs	TERRESTRE Appliquer lorsque les masses d'œufs commencent à éclore, mais pas plus tard qu'après l'apparition des premiers trous sur les feuilles. Diriger la pulvérisation vers le verticille de la plante. Répéter le traitement à intervalles de 5 à 8 jours. Pour supprimer la deuxième génération, diriger la pulvérisation vers la zone de l'épi.	500 à 600 mL/ha dans 240 L d'eau par hectare
NE PAS APPLIQUER PLUS DE 3 FOIS PAR ANNÉE. Voir les instructions ci-dessus.			

CULTURES	INSECTES	MÉTHODE D'APPLICATION ET RECOMMANDATIONS	DOSE
<p>AVIS À L'UTILISATEUR : LIRE CE QUI SUIT AVANT D'APPLIQUER CE PRODUIT POUR L'USAGE SPÉCIAL INDIQUÉ.</p> <p>Le MODE D'EMPLOI de ce produit pour le ou les usages spéciaux décrits ci-dessous a été rédigé par des personnes autres que Sharda Cropchem Limited et est homologué par Santé Canada dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Sharda Cropchem Limited ne formule aucune allégation ni n'offre aucune garantie concernant l'efficacité du produit et/ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) lorsque ce produit est employé sur les cultures figurant ci-dessous.</p> <p>En foi de quoi l'acheteur et l'utilisateur assument tous les risques relatifs à l'efficacité du produit et à la tolérance des cultures, et ils acceptent de dégager Sharda Cropchem Limited de toute responsabilité liée à des réclamations relatives à l'efficacité et/ou à la phytotoxicité</p>			
Maïs de grande culture	Ver-gris occidental des haricots	<p>TERRESTRE</p> <p>Le traitement doit être établi d'après le dépistage local, en fonction de la présence de ravageurs aux stades de développement vulnérables et de fortes populations de ravageurs.</p> <p>Répéter à intervalles de 5 à 8 jours.</p>	500 à 600 mL/ha dans au moins 240 L d'eau par hectare.
<p>NE PAS APPLIQUER MOINS D'UN JOUR AVANT LA RÉCOLTE.</p> <p>NE PAS APPLIQUER PLUS DE 3 FOIS PAR ANNÉE.</p>			

AVIS À L'UTILISATEUR : LIRE CE QUI SUIT AVANT D'APPLIQUER CE PRODUIT POUR L'USAGE SPÉCIAL INDIQUÉ.

Le MODE D'EMPLOI de ce produit pour le ou les usages spéciaux décrits ci-dessous a été rédigé par des personnes autres que Sharda Cropchem Limited et est homologué par Santé Canada dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Sharda Cropchem Limited ne formule aucune allégation ni n'offre aucune garantie concernant l'efficacité du produit et/ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) lorsque ce produit est employé sur les cultures figurant ci-dessous.

En foi de quoi l'acheteur et l'utilisateur assument tous les risques relatifs à l'efficacité du produit et à la tolérance des cultures, et ils acceptent de dégager Sharda Cropchem Limited de toute responsabilité liée à des réclamations relatives à l'efficacité et/ou à la phytotoxicité

Moutarde oléagineuse	Tisseuse de la betterave	<p>TERRESTRE Appliquer une fois par saison lorsque les larves sont présentes et se nourrissent activement. Utiliser la dose la plus élevée en cas de forte infestation ou si le couvert végétal est dense.</p>	200 à 300 mL/ha dans 100 L d'eau par hectare
	Altise	<p>TERRESTRE Appliquer une fois par saison en présence des insectes. Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest ne supprime que les insectes présents. Faire l'application lorsque les altises se nourrissent activement. En cas de forte infestation, appliquer également sur une bande de 15 mètres le long des clôtures autour du champ.</p>	200 à 300 mL/ha dans 100 L d'eau par hectare
	Altise	<p>AÉRIENNE Faire un épandage aérien par saison, au besoin. Lire les instructions spéciales concernant l'épandage aérien à l'avant de la brochure. Prévoir un tampon de 100 mètres entre la culture et tout plan</p>	200 à 300 mL/ha dans 11 à 22 L d'eau par hectare
	Ver-gris du trèfle, légionnaire Bertha, fausse-teigne des crucifères	<p>AÉRIENNE Appliquer une fois par saison en présence des insectes ou si les spécialistes provinciaux recommandent l'épandage. Appliquer lorsque les insectes se nourrissent activement. En cas de forte infestation, utiliser la dose la plus élevée de Poleci 2,5 EC Insecticide,</p>	200 à 300 mL/ha dans 11 à 22 L d'eau par hectare

	Charançon de la graine du chou	<p>TERRESTRE Pour la suppression de l'adulte seulement. Appliquer une fois par saison en présence des insectes sur les boutons de fleurs ou sur les gousses en formation. Doit être appliqué avant la ponte des œufs. Consulter un spécialiste agricole pour connaître le seuil économique.</p>	400 mL/ha dans 100 L d'eau par hectare
	Punaise	<p>AÉRIENNE Pour la suppression de l'adulte seulement. Appliquer une fois par saison en présence des insectes sur les boutons de fleurs ou sur les gousses en formation. Doit être appliqué avant la ponte des œufs. Consulter un spécialiste agricole pour connaître le seuil économique.</p>	400 mL/ha dans 11 à 22 L d'eau par hectare
		<p>TERRESTRE Appliquer une fois par saison lorsque les punaises se nourrissent des boutons, des fleurs et des gousses en formation. Consulter un spécialiste agricole pour connaître le seuil économique.</p>	300 mL/ha dans 100 L d'eau par hectare
		<p>AÉRIENNE Appliquer une fois lorsque les punaises se nourrissent des boutons, des fleurs et des gousses en formation. Consulter un spécialiste agricole pour connaître le seuil économique.</p>	300 mL/ha dans 11 à 22 L d'eau par hectare
	Sauterelle	<p>TERRESTRE Suivre les prévisions provinciales. Appliquer une fois par saison en présence de jeunes sauterelles ou de signes de dommages évidents. Appliquer lorsque les sauterelles sont aux stades nymphaux 2 à 4. On obtiendra une meilleure suppression lorsque l'application est faite avant le développement des ailes. En cas de forte infestation, une application doit également être faite sur une bande de</p>	200 à 300 mL/ha dans 100 L d'eau par hectare

		<p>15 mètres le long des clôtures autour du champ. La dose élevée doit être utilisée lorsque la proportion d'insectes à maturité et aux stades nymphaux avancés est élevée et que la densité du couvert de la culture empêche la pénétration de la solution pulvérisée.</p> <p>AÉRIENNE</p> <p>Suivre le mode d'emploi et les instructions spéciales et prévoir un tampon de 100 mètres à partir des zones écologiquement fragiles. Appliquer une fois par saison.</p>	<p>300 mL/ha dans 11 à 22 L d'eau par hectare</p>
<p>NE PAS APPLIQUER DANS LES 7 JOURS PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE.</p>			

Pommes de terre	Doryphore de la pomme de terre, punaise terne, cicadelle	<p>TERRESTRE</p> <p>Appliquer en présence des insectes ou de signes de dommages évidents. Répéter le traitement au besoin, jusqu'à concurrence de 3 fois par année. Utiliser la dose la plus élevée en cas de forte infestation.</p>	200 à 300 mL/ha dans 200 à 500 L d'eau par hectare
	Altise de la pomme de terre	<p>Appliquer en présence des insectes ou de signes de dommages évidents. Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest ne supprime que les insectes présents. Si les populations d'altises sont élevées, appliquer également sur une bande de 15 mètres le long des rangs extérieurs autour du champ.</p>	
	Doryphore de la pomme de terre, punaise terne, cicadelle, altise de la pomme de terre	<p>AÉRIENNE</p> <p>Faire un maximum de 2 épandages aériens par saison, au besoin. Lire les instructions spéciales concernant l'épandage aérien au début de la brochure. Prévoir un tampon de 100 mètres entre la</p>	200 à 300 mL/ha dans 11 à 22 L d'eau par hectare
<p>NE PAS APPLIQUER DANS LES 24 HEURES PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE. PEUT ÊTRE APPLIQUÉ UNE FOIS PAR SAISON SUR LES SOLS TRÈS ORGANIQUES (TERRES NOIRES). POUR RÉDUIRE LES RÉSIDUS, APPLIQUER AVANT LE 1^{er} AOÛT.</p>			

Colza, canola, moutarde	Tisseuse de la betterave	<p>TERRESTRE Appliquer lorsque les larves sont présentes et se nourrissent activement. Utiliser la dose la plus élevée en cas de forte infestation ou si le couvert végétal est dense.</p>	200 à 300 mL/ha dans 100 L d'eau par hectare
	Altise	<p>TERRESTRE Appliquer en présence des insectes. Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest ne supprime que les insectes présents. Faire l'application lorsque les altises se nourrissent activement. En cas de forte infestation, appliquer également sur une bande de 15 mètres le long des rangs extérieurs autour du champ.</p>	200 à 300 mL/ha dans 100 L d'eau par hectare
	Altise	<p>AÉRIENNE Faire un épandage aérien par saison, au besoin. Lire les instructions spéciales concernant l'épandage aérien au début de la brochure. Prévoir un tampon de 100 mètres entre la culture et tout plan d'eau.</p>	200 à 300 mL/ha dans 11 à 22 L d'eau par hectare

<p>Ver-gris du trèfle, légionnaire Bertha, fausse-teigne des crucifères</p>	<p>AÉRIENNE Appliquer une fois en présence des insectes ou si les spécialistes provinciaux recommandent l'épandage. Appliquer également lorsque les insectes se nourrissent activement. En cas de forte infestation, utiliser la dose la plus élevée de Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest.</p>	<p>200 à 300 mL/ha dans 11 à 22 L d'eau par hectare</p>
<p>Charançon de la graine du chou</p>	<p>TERRESTRE Pour la suppression de l'adulte seulement. Appliquer une fois en présence des insectes sur les boutons de fleurs ou sur les gousses en formation. Doit être appliqué avant la ponte des oeufs. Consulter un spécialiste agricole pour connaître le seuil économique.</p>	<p>400 mL/ha dans 100 L d'eau par hectare</p>
	<p>AÉRIENNE Pour la suppression de l'adulte seulement. Appliquer une fois en présence des insectes sur les boutons de fleurs ou sur les gousses en formation. Doit être appliqué avant la ponte des oeufs. Consulter un spécialiste agricole pour connaître le seuil économique.</p>	<p>400 mL/ha dans 11 à 22 L d'eau par hectare</p>
<p>Punaise</p>	<p>TERRESTRE Appliquer une fois lorsque les punaises se nourrissent des boutons, des fleurs et des gousses en formation. Consulter un spécialiste agricole pour connaître le seuil économique.</p>	<p>300 mL/ha dans 100 L d'eau par hectare</p>
	<p>AÉRIENNE Appliquer une fois lorsque les punaises se nourrissent des boutons, des fleurs et des gousses en formation. Consulter un spécialiste agricole pour connaître le seuil économique.</p>	<p>300 mL/ha dans 11 à 22 L d'eau par hectare</p>

Canola	Sauterelle	<p>TERRESTRE Suivre les prévisions provinciales : Appliquer en présence de jeunes sauterelles ou de signes de dommages évidents. Appliquer lorsque les sauterelles sont aux stades nymphaux 2 à 4. On obtiendra une meilleure suppression lorsque l'application est faite avant le développement des ailes. En cas de forte infestation, une application doit également être faite sur une bordure de 15 mètres autour du champ. La dose élevée doit être utilisée lorsque la proportion d'insectes à maturité et aux stades nymphaux avancés est élevée et que la densité du couvert de la culture empêche la pénétration de la solution pulvérisée.</p> <p>AÉRIENNE Suivre le mode d'emploi et les instructions spéciales et prévoir un tampon de 100 mètres à partir des zones écologiquement fragiles.</p>	<p>200 à 300 mL/ha dans 100 L d'eau par hectare</p> <p>300 mL/ha dans 11 à 22 L d'eau par hectare</p>
--------	------------	---	---

NE PAS APPLIQUER DANS LES 7 JOURS PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE.

Amélanhier	Tenthrede, punaise terne, <i>Pseudanthonomus crataegi</i> , charançon de la pomme, mineuse des feuilles, pique-bouton de l'amélanhier	<p>TERRESTRE</p> <p>Appliquer trois fois par saison, une fois avant la floraison, une fois au début de la floraison et une fois après le stade du calice, en observant un délai d'attente avant la récolte de 21 jours. Les espèces d'insectes supprimées apparaissent à différentes périodes de la saison de croissance : pique-bouton de l'amélanhier et punaise terne, du débourrement (stade de l'éclatement) au stade du bouton vert; tenthrede, à 25 % de la floraison; charançon de la pomme et <i>Pseudanthonomus crataegi</i>, 5 à 10 jours après le stade du calice. On encourage les producteurs à appliquer Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest lorsque les insectes nuisibles sont suffisamment nombreux pour causer des</p>	4 mL dans 4,5 L d'eau pour 100 m ² de rang frontal de verger (Appliquer la solution des deux côtés de chaque rang)
NE PAS APPLIQUER DANS LES 21 JOURS PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE.			

Plantations brise-vent	Puceron du caragan, tordeuse des bourgeons de l'épinette, pyrale des cônes de l'épinette, tordeuse verte de l'épinette, puceron tacheté du peuplier, livrée des forêts, livrée des Prairies	<p>TERRESTRE Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquer lorsque les insectes se nourrissent activement. La suppression est fonction d'un épandage intégral.</p>	180 mL par 100 L d'eau appliqué jusqu'au ruissellement
	Livrée des forêts	<p>AÉRIENNE Appliquer lorsque les larves se nourrissent activement. Utiliser la dose la plus élevée si le nombre de larves présentes est élevé ou si un feuillage dense peut empêcher la pénétration de la solution pulvérisée.</p>	200 à 300 mL/ha dans 11 à 22 L d'eau par hectare
	Méloés, galéruque grise du saule	<p>TERRESTRE Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquer lorsque les insectes se nourrissent activement. La suppression est fonction d'un épandage intégral.</p>	60 mL par 100 L d'eau appliqué jusqu'au ruissellement
	Némate du saule	<p>TERRESTRE Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquer lorsque les larves se nourrissent activement. La suppression est fonction d'un épandage intégral.</p>	36 mL par 100 L d'eau appliqué jusqu'au ruissellement
NE PAS APPLIQUER PLUS DE 1 FOIS PAR ANNÉE.			

AVIS À L'UTILISATEUR : LIRE CE QUI SUIT AVANT D'APPLIQUER CE PRODUIT POUR L'USAGE SPÉCIAL INDIQUÉ.

Le **MODE D'EMPLOI** de ce produit pour le ou les usages spéciaux décrits ci-dessous a été rédigé par des personnes autres que Sharda Cropchem Limited et est homologué par Santé Canada dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Sharda Cropchem Limited ne formule aucune allégation ni n'offre aucune garantie concernant l'efficacité du produit et/ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) lorsque ce produit est employé sur les cultures figurant ci-dessous.

En foi de quoi l'acheteur et l'utilisateur assument tous les risques relatifs à l'efficacité du produit et à la tolérance des cultures, et ils acceptent de dégager Sharda Cropchem Limited de toute responsabilité liée à des réclamations relatives à l'efficacité et/ou à la phytotoxicité du produit lorsque celui-ci est appliqué aux fins des usages décrits ci-dessous.

Trèfle rouge établi (pour la production de semence seulement)	Répression du charançon à rostre noir	TERRESTRE Appliquer en présence des insectes. Faire deux applications à intervalle de 14 jours, au début du stade végétatif et lorsque le trèfle est en boutons. Utiliser suffisamment d'eau pour couvrir à fond. Une plus grande quantité d'eau peut être requise si le feuillage est dense et selon le type d'équipement de pulvérisation utilisé. Un mouillage complet de la plante est essentiel pour obtenir de bons résultats.	500 mL/ha dans 100 à 300 L d'eau par hectare
---	---------------------------------------	--	--

**NE PAS FAIRE PLUS DE 2 APPLICATIONS PAR ANNÉE.
NE PAS UTILISER LA CULTURE TRAITÉE COMME FOURRAGE.
NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE.**

AVIS À L'UTILISATEUR : LIRE CE QUI SUIT AVANT D'APPLIQUER CE PRODUIT POUR L'USAGE SPÉCIAL INDIQUÉ.

Le MODE D'EMPLOI de ce produit pour le ou les usages spéciaux décrits ci-dessous a été rédigé par des personnes autres que Sharda Cropchem Limited et est homologué par Santé Canada dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Sharda Cropchem Limited ne formule aucune allégation ni n'offre aucune garantie concernant l'efficacité du produit et/ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) lorsque ce produit est employé sur les cultures figurant ci-dessous.

En foi de quoi l'acheteur et l'utilisateur assument tous les risques relatifs à l'efficacité du produit et à la tolérance des cultures, et ils acceptent de dégager Sharda Cropchem Limited de toute responsabilité liée à des réclamations relatives à l'efficacité et/ou à la phytotoxicité du produit lorsque celui-ci est appliqué aux fins des usages décrits ci-dessous.

Parcours, pâturages, bords de route*	Sauterelle	<p>TERRESTRE Appliquer lorsque les insectes sont jeunes ou que des signes de dommages sont évidents. Appliquer lorsque les sauterelles sont aux stades nymphaux 2 à 4. On obtiendra une meilleure suppression lorsque l'application est faite avant le développement des ailes. NE PAS APPLIQUER SUR DES CULTURES VOISINES NON HOMOLOGUÉES. La dose élevée doit être utilisée lorsque la proportion de stades nymphaux avancés et à maturité est élevée et que la densité du couvert empêche la pénétration de la solution pulvérisée. * En cas de forte infestation, une application doit aussi être faite sur une bande de 15 mètres le long des clôtures et sur le bord des routes.</p>	200 à 300 mL/ha dans 100 à 200 L d'eau par hectare
Parcours, pâturages		<p>AÉRIENNE Suivre le mode d'emploi et les directives spéciales concernant le maintien d'un tampon de 100 mètres entre la culture traitée et les zones écologiquement fragiles.</p>	300 mL/ha dans 11 à 22 L d'eau par hectare

NE PAS FAIRE PLUS DE 2 APPLICATIONS AÉRIENNES PAR ANNÉE.

NE PAS APPLIQUER POLECI 2,5 EC INSECTICIDE, RÉGION OUEST CE PLUS DE 3 FOIS PAR ANNÉE. PAR EXEMPLE, 3 APPLICATIONS TERRESTRES OU 2 TERRESTRES /1 AÉRIENNE OU 2 AÉRIENNES/1 TERRESTRE.

Plantations brise-vent de cerisiers de Virginie	Livrée des Prairies Tordeuse du cerisier Tordeuse du pommier	Appliquer avant la floraison lorsque les tentés sont visibles, en général entre la mi-mai et la fin mai Appliquer après la floraison lorsque les tentés sont visibles, en général entre le début juin et la mi-juin Appliquer après la floraison lorsque les dommages sont notés pour la première fois, en général entre le début juin et la mi-juin	184 mL de produit /1 000 L d'eau
<p>Appliquer comme traitement foliaire; application au sol seulement – UNE application par année. Appliquer de façon à mouiller les feuilles mais pas au point d'égouttement. Porter des vêtements protecteurs y compris une chemise à manches longues, des pantalons longs et des gants résistant aux produits chimiques lors de la manipulation ou de la pulvérisation du produit.</p>			

Tournesol	Chrysomèle du tournesol	<p>TERRESTRE ADULTES : Appliquer en présence des insectes ou de signes de dommages évidents. Les cultures doivent être traitées du stade du cotylédon au stade 2 feuilles.</p> <p>AÉRIENNE ADULTES ET LARVES : Appliquer une fois par saison en présence des insectes ou de signes de dommages évidents. Vérifier soigneusement si des larves se trouvent dans les têtes. Il est préférable de faire l'épandage à la brunante lorsque les insectes se nourrissent activement.</p>	<p>200 mL/ha dans 100 à 200 L d'eau par hectare</p> <p>200 mL/ha dans 11 à 22 L d'eau par hectare</p>
NE PAS APPLIQUER DANS LES 70 JOURS PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE.			
Tomates	Doryphore de la pomme de terre	<p>TERRESTRE Appliquer en présence des insectes ou de signes de dommages évidents. Répéter le traitement au besoin, jusqu'à concurrence de 3 fois par année. Utiliser la dose la plus élevée en cas de forte infestation.</p>	200 à 300mL/ha dans 200 à 500 L d'eau par hectare
NE PAS TRAITER DANS LES 3 JOURS PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE.			
PEUT ÊTRE UTILISÉ UNE FOIS PAR SAISON SUR LES SOLS TRÈS ORGANIQUES (TERRES NOIRES). POUR RÉDUIRE LES RÉSIDUS, APPLIQUER AVANT LE 1 ^{er} AOÛT.			
(Voir les instructions ci-dessus)			
RÉSISTANCE : Il est reconnu que le doryphore de la pomme de terre devient résistant aux insecticides suite à un usage répété. Comme pour tout insecticide, l'utilisation de ce produit doit être conforme aux stratégies de gestion de la résistance établies pour la région. On doit utiliser Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest en alternance avec des insecticides présentant un mode d'action différent. Consulter le conseiller agricole pour connaître les stratégies de gestion de la résistance et les pratiques de lutte antiparasitaire recommandées dans votre région.			

Blé, orge, avoine, lin, lentilles, betterave à sucre	Ver-gris	<p>TERRESTRE OU AÉRIENNE Appliquer une fois par saison lorsque les larves sont présentes et se nourrissent. Ne pas déplacer le sol après l'épandage. En cas de forte infestation, appliquer également sur une bande de 15 mètres le long des rangs extérieurs autour du champ. NE PAS APPLIQUER SUR LES CULTURES ADJACENTES. Lire les instructions spéciales concernant l'épandage aérien au début de la brochure. Prévoir un tampon de 100 mètres (épandage aérien) et de 15 mètres (épandage terrestre) à partir des zones écologiquement fragiles.</p>	400 mL/ha dans 100 L d'eau par hectare
	Ver-gris du trèfle (lin seulement)	<p>TERRESTRE OU AÉRIENNE Faire un épandage aérien par saison en présence des insectes, au besoin. Lire les instructions spéciales concernant l'épandage aérien au début de la brochure. Pour l'épandage aérien, prévoir un tampon de 100 mètres entre la culture et tout plan d'eau.</p>	200 à 300 mL/ha dans 100 L d'eau par hectare
	Tisseuse de la betterave (lin seulement)	<p>TERRESTRE Appliquer une fois par saison lorsque les larves sont présentes et se nourrissent activement. Utiliser la dose la plus élevée lorsque le degré d'infestation est élevé ou que le couvert de la culture est dense.</p>	200 à 300 mL/ha dans 100 L d'eau par hectare

NE PAS FAIRE PLUS DE 3 APPLICATIONS DE POLECI 2,5 EC INSECTICIDE, RÉGION OUEST PAR ANNÉE. ON PEUT EFFECTUER UN MAXIMUM DE 2 ÉPANDAGES AÉRIENS DE POLECI 2,5 EC INSECTICIDE, RÉGION OUEST PAR ANNÉE.

NE PAS APPLIQUER SUR LE BLÉ, LE LIN OU L'ORGE DANS LES 40 JOURS PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE.

NE PAS APPLIQUER SUR L'AVOINE DANS LES 31 JOURS PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE.

NE PAS APPLIQUER SUR LES LENTILLES DANS LES 30 JOURS PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE.

NE PAS APPLIQUER SUR LA BETTERAVE À SUCRE DANS LES 100 JOURS PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE.

<p>Blé, orge, avoine, lin, lentilles</p>	<p>Sauterelle</p>	<p>TERRESTRE Suivre les prévisions provinciales : Appliquer en présence de jeunes sauterelles ou de signes de dommages évidents. Appliquer lorsque les sauterelles sont aux stades nymphaux 2 à 4. On obtiendra une meilleure suppression lorsque l'application est faite avant le développement des ailes. En cas de forte infestation, une application doit également être faite sur une bordure de 15 mètres autour du champ. NE PAS APPLIQUER SUR DES CULTURES NON HOMOLOGUÉES. La dose élevée doit être utilisée lorsque la proportion d'insectes à maturité et aux stades nymphaux avancés est élevée et que la densité du couvert de la culture empêche la pénétration de la solution pulvérisée.</p> <p>AÉRIENNE Suivre le mode d'emploi et les instructions spéciales et prévoir un tampon de 100 mètres à partir des zones écologiquement fragiles. Ne pas faire d'application aérienne du mélange en cuve de Poleci 2,5 EC Insecticide, Région Ouest avec l'herbicide Bucril M et l'herbicide Puma¹²⁰ Super.</p>	<p>200 à 300 mL/ha dans 100 à 200 L d'eau par hectare</p> <p>300 mL/ha dans 11 à 22 L d'eau par hectare</p>
--	-------------------	---	---

NE PAS FAIRE PLUS DE 3 APPLICATIONS DU SHARDA DELTAMETHRIN 2,5 %
EC PAR ANNÉE.
ON PEUT EFFECTUER UN MAXIMUM DE 2 ÉPANDAGES AÉRIENS DU SHARDA
DELTAMETHRIN 2,5 % EC PAR ANNÉE.
NE PAS APPLIQUER SUR LE BLÉ, LE LIN OU L'ORGE DANS LES 40 JOURS PRÉCÉDANT
LA RÉCOLTE.
NE PAS APPLIQUER SUR L'AVOINE DANS LES 31 JOURS PRÉCÉDANT LA RÉCOLTE.
NE PAS APPLIQUER SUR LES LENTILLES DANS LES 30 JOURS PRÉCÉDANT LA
RÉCOLTE.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
COMMUNIQUER AVEC :

SHARDA CROP CHEM LIMITED
1-888-931-2530

Buctril, Pardner et Puma120 Super sont des marques de commerce déposées de Bayer CropScience. Banvel est une marque de commerce déposée de BASF.