Arrow®
Cléthodime

Herbicide – Suppression des graminées adventices

Suppression à large spectre des graminées adventices dans le canola, les légumineuses et d'autres cultures à feuilles larges et cultures de spécialité

Matière active : Cléthodime

Famille chimique : Groupe 1

Mode d'action : La matière active se déplace du feuillage traité vers les points de croissance des feuilles, des pousses et des racines. Les feuilles jaunissent d'abord, puis deviennent pourpres avant de finalement brunir. Les nouvelles feuilles se détachent facilement de la mauvaise herbe traitée après 3 à 5 jours. Normalement, une suppression complète est obtenue de 7 à 21 jours après le traitement, selon les conditions de croissance et la concurrence exercée par la culture.

Cultures homologuées :

- Bleuet en corymbe
- Canola
- Coriandre
- Épinard
- Fenugrec
- Haricot
- Moutarde
- Oignon
- Pois
- Lentille
- Lin
- Linola™
- Pois chiche
- Pomme de terre
- Pousse de luzerne
- Saponaire des vaches
- Soya
- Tournesol

Mauvaises herbes supprimées :

Graminées	Stades foliaires	Doses d'application
Céréales spontanées (blé, orge, avoine) Folle avoine Sétaires (verte, glauque)	2 – 4	124 mL/ha (50 mL/acre)
Alpiste des Canaries spontané Échinochloa pied-de-coq Maïs spontané Panic capillaire Panic d'automne Panic millet	2 – 6	124 mL/ha (50 mL/acre)
Alpiste des Canaries spontané Céréales spontanées (blé, orge, avoine) Chiendent – Répression Digitaires (astringente, sanguine) Échinochloa pied-de-coq Folle avoine Ivraie de Perse Maïs spontané Panic capillaire Panic d'automne Panic millet Sétaires (verte, glauque)	2 – 6	198 mL/ha (80 mL/acre)
Chiendent - Suppression	2 – 6	371 mL/ha (150 mL/acre)

Herbicide – Suppression des graminées adventices

Arrow®
Cléthodime

Stade de la culture :
- La plupart des cultures étant tolérantes à cet herbicide à tous les stades, effectuer les applications au stade optimal de la mauvaise herbe
- Toujours respecter le délai avant récolte pour toutes les cultures

Doses d'application et formats :
- 124 mL/ha (50 mL/acre) en cas d'infestation légère, soit 24,3 ha (60 acres) par caisse
- 198 mL/ha (80 mL/acre) en cas d'infestation modérée, soit 16,2 ha (40 acres) par caisse
- 371 mL/ha (150 mL/acre) pour supprimer le chiendent, soit 8,1 ha (20 acres) par caisse
- 1 bidon de 3 L plus 1 bidon d'adjuvant X-ACT®

Volume d'eau :
- Application par voie terrestre seulement
- 50 à 222 L/ha (20 à 90 L/acre) pour obtenir une couverture uniforme

Résistance à l'entraînement par la pluie : 1 heure

Mélanges en cuve homologués et soutenus :
- Canola : Lontrel® ou Muster®
- Canola Clearfield® seulement : Imazéthapyr (Phantom®)
- Canola Liberty Link® seulement : Liberty®
- Pois fourrager : Imazéthapyr (Phantom®)
- Lin, y compris les variétés à faible teneur en acide linolénique : Bromoxynil et MCPA ester (Badge®) ou Curtail® M
- Lin, excluant les variétés à faible teneur en acide linoléique : Lontrel® ou MCPA ester
- Soya tolérant au glyphosate : Glyphosate

Directives de mélange :
1. Remplir la moitié de la cuve préalablement nettoyée du pulvérisateur avec de l'eau. Démarrer l'agitation
2. Ajouter la quantité requise de Arrow 240 EC. Continuer l'agitation
3. Ajouter la quantité requise d'adjuvant X-ACT ainsi que la quantité d'eau nécessaire pour remplir la cuve du pulvérisateur
4. Poursuivre l'agitation ou activer le système de dérivation
5. Après toute interruption de la pulvérisation, bien agiter le mélange avant de pulvériser de nouveau
6. Ne pas laisser la bouillie de pulvérisation reposer dans la cuve pendant la nuit
7. Pour les mélanges en cuve, suivre les directives sur l'étiquette de chaque partenaire de mélange

Rotation des cultures : Aucune restriction quand l'herbicide Arrow est appliqué seul

Délai avant récolte :
- Bleuet, épinard : 14 jours
- Canola, coriandre, haricot, lin (y compris les variétés à faible teneur en acide linolénique), lentille, pomme de terre, pois chiche, moutarde : 60 jours
- Luzerne, fenugrec : 30 jours
- Oignon : 45 jours
- Soya, pois : 75 jours
- Tournesol : 72 jours

Restrictions de pâturage : Ne pas faire paître le bétail dans les cultures traitées ni couper celles-ci comme fourrage pendant les 60 jours suivant l'application

Conservation :
- Peut être conservé à n'importe quelle température
- Bien agiter avant l'utilisation

Conseils pratiques :
- Arrow donne de meilleurs résultats quand il est appliqué sur des plantes en croissance active
- Une certaine repousse peut se produire si le produit est appliqué sur des mauvaises herbes en conditions de stress
- Arrow doit être utilisé avec l'adjuvant X-ACT

ADAMA

Toujours lire l'étiquette et s'y conformer.
Sans frais : 1.855.264.6262
SITE WEB : adama.com/Canada

Croître. Simplement. Ensemble.

® Arrow, Badge, Phantom et X-ACT sont des marques déposées d'ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd.
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs. 1181-1/0415