



Overall[®] 240 SC

Iprodione

Fongicide

Maîtrise efficace de la sclérotiniose et de l'alternariose dans les cultures de luzerne et de canola

Matière active : Iprodione

Famille chimique : Groupe 2

Mode d'action : Fongicide systémique agissant par contact utilisé comme fongicide protectant et éradicant.

Cultures homologuées :

- Canola
- Luzerne (cultivée pour la semence; Ouest du Canada)

Principales maladies supprimées :

- Alternariose
- Sclérotiniose

Moment d'application et stade de la culture :

Cultures	Maladies	Moment d'application
Canola	Sclérotiniose Alternariose (répression)	Appliquer de 2,1 à 3,1 L/ha (0,85 à 1,25 L/acre) lorsque le canola est de 20 à 50 % en fleurs. La meilleure protection est obtenue au stade 20 à 30 % en fleurs. Effectuée avant la chute des pétales, cette application permettra de protéger un nombre maximal de pétales. Le fongicide Overall 240 SC peut être appliqué jusqu'au stade 50 % en fleurs, soit lorsque la culture affiche le jaune le plus vif et avant la perte d'un nombre important de pétales
	Alternariose (suppression)	Appliquer au stade du début de la cosse verte à la dose de 3,1 L/ha (1,25 L/acre), ou faire deux applications fractionnées à la dose de 1,1 L/ha (0,43 L/acre), d'abord au stade 20 à 50 % en fleurs, puis au stade de début de la cosse verte. Si un traitement de 2,1 à 3,1 L/ha a été effectué au stade 20 à 50 % en fleurs, la sclérotiniose sera également supprimée
Luzerne* (cultivée pour la semence)	Sclérotiniose	Faire une seule application à raison de 2,1 à 3,1 L/ha (0,85 à 1,25 L/acre) lorsque la culture est au stade 20 à 50 % en fleurs

*Ouest du Canada seulement.



Fongicide

Overall[®] 240 SC

Iprodione



Doses d'application et formats :

- 2,1 L/ha (0,85 L/acre), soit 4 ha (10 acres) par bidon de 8,4 L
- 3,1 L/ha (1,25 L/acre), soit 2,7 ha (6,72 acres) par bidon de 8,4 L
- 2 bidons de 8,4 L par caisse

Volume d'eau :

- Par voie terrestre : minimum de 100 L/ha (40 L/acre)
- Par voie aérienne : minimum de 7,3 ha (18 L/acre)

Résistance à l'entraînement par la pluie :

- Retarder l'application si on prévoit des précipitations imminentes
- Ne pas appliquer immédiatement après une précipitation

Mélanges en cuve homologués et soutenus : Aucun mélange listé

Directives de mélange :

1. Verser la moitié de la quantité d'eau requise dans le cuve du pulvérisateur
2. Ajouter le fongicide Overall 240 SC en remuant et ajouter le reste de l'eau
3. S'assurer de bien mélanger
4. Bien agiter avant chaque application et maintenir l'agitation durant toute la pulvérisation
5. La bouillie de pulvérisation doit être utilisée dès que possible le jour même de sa préparation, surtout si l'eau utilisée pour le mélange est alcaline (pH supérieur à 7)

Rotation des cultures : Aucune restriction

Délai avant récolte : Luzerne : 38 jours

Restrictions de pâturage : Ne pas servir la luzerne traitée comme aliment pour le bétail

Conservation : Protéger du gel

Conseils pratiques :

- Utiliser les outils de prévision pour déterminer la nécessité de faire les traitements fongicides



Croître. Simplement. Ensemble.

ADAMA

Toujours lire l'étiquette et s'y conformer.
Sans frais : 1.855.264.6262
SITE WEB : adama.com/Canada

® Overall est une marque déposée d'ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd.
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs. 1181-1/0415