



Topnotch™

Azoxystrobine et Propiconazole

Fongicide

Une préparation unique d'azoxystrobine et de propiconazole procurant une protection à large spectre contre les maladies foliaires des céréales

Matières actives : Azoxystrobine et propiconazole

Familles chimiques : Groupe 3 (propiconazole) et Groupe 11 (azoxystrobine)

Mode d'action : Utilisé à la fois pour ses propriétés préventives et curatives, le fongicide Topnotch procure une activité de contact et systémique à large spectre.

Cultures homologuées :

- Avoine
- Blé
- Orge
- Seigle
- Triticale

Principales maladies supprimées :

- Rayures réticulées
- Rouille brune
- Rouille naine
- Rouille striée
- Septoriose des feuilles
- Tache auréolée
- Tache pâle

Moment d'application et stade de la culture :

Cultures	Maladies	Moment d'application
Avoine	Rayures réticulées Rouille couronnée Septoriose des feuilles	Faire une application entre la montaison et la mi-épiaison (Stades 29 à 55 de l'échelle BBCH)
Blé	Rouille des feuilles Rouille striée Septoriose des feuilles Tache auréolée	Faire une application entre la montaison et la mi-épiaison (Stades 29 à 55 de l'échelle BBCH)
Orge	Rayures réticulées Rouille naine Rouille striée Septoriose des feuilles Tache auréolée Tache pâle	Faire une application entre la montaison et la mi-épiaison (Stades 29 à 55 de l'échelle BBCH)
Seigle	Septoriose des feuilles Tache auréolée Tache pâle	Faire une application entre la montaison et la mi-épiaison (Stades 29 à 55 de l'échelle BBCH)
Triticale	Septoriose des feuilles Tache auréolée	Faire une application entre la montaison et la mi-épiaison (Stades 29 à 55 de l'échelle BBCH)





Doses d'application et formats :

- 524 mL/ha (212 mL/acre), soit 32,4 ha (80 acres) par caisse
- 2 bidons de 8,6 L par caisse

Volume d'eau :

- Par voie terrestre : minimum de 100 L/ha (40 L/acre)
- Par voie aérienne : 45 L/ha (18 L/acre)

Résistance à l'entraînement par la pluie : Non spécifiée

Mélanges en cuve homologués et soutenus :

Herbicides

- Axial®
- Broadband®
- Clodinafop-propargyl (Ladder®, Horizon®)
- Sierra®
- Touchdown Total®
- Traxion™

Insecticides

- Lambda-cyhalothrine (Silencer®, Matador®)

Fongicides

- Quadris®

Directives de mélange :

1. Remplir entre la moitié et les 2/3 de la cuve du pulvérisateur avec de l'eau
2. Tout en agitant, ajouter la quantité requise de Topnotch, puis finir de remplir la cuve avec de l'eau en continuant à agiter
3. Commencer l'application quand Topnotch est complètement dissous dans l'eau de mélange et maintenir l'agitation durant toute l'application

Rotation des cultures : Ne pas ensemer aucune autre culture destinée à l'alimentation du bétail, au pâturage ou à tout autre ingrédient entrant dans la composition des rations ou de la litière pendant les 105 jours suivant l'application

Délai avant récolte : 45 jours

Restrictions de pâturage : Aucune restriction

Conservation : Ne pas conserver sous 0 °C

Conseils pratiques :

- Pour des résultats optimaux, il est important que la bouillie de pulvérisation couvre et pénètre bien le couvert végétal

